

Листок-вкладыш: информация для пациентов

Оспамокс, 125 мг /5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
Оспамокс, 250 мг /5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

Действующее вещество: амоксициллин

Перед приемом препарата полностью прочитайте данный листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Данный препарат назначен именно вам (или вашему ребенку). Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вашего ребенка возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Оспамокс, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Оспамокс.
3. Прием препарата Оспамокс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Оспамокс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Оспамокс, и для чего его применяют.

Оспамокс является антибиотиком, который уничтожает бактерии, вызывающие инфекции. Действующим веществом препарата Оспамокс является амоксициллин. Амоксициллин относится к группе препаратов, которые называются «пенициллины».

Препарат Оспамокс применяется для лечения следующих инфекций у взрослых и детей:

- острый бактериальный синусит;
- острый средний отит;
- острый стрептококковый тонзиллит и фарингит;
- обострение хронического бронхита;
- внебольничная пневмония;
- острый цистит;
- бессимптомная бактериурия во время беременности;
- острый пиелонефрит;
- тиф и паратиф;
- околозубной абсцесс с распространяющимся воспалением прилегающих тканей;
- инфекции протезированных суставов;
- эрадикация *Helicobacter pylori*;
- болезнь Лайма.

Также Оспамокс может применяться для профилактики эндокардита.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 3 - 5 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Оспамокс.

Не применяйте препарат Оспамокс,

- если у вас или у вашего ребенка аллергия на амоксициллин, другие пенициллины или на любой вспомогательный компонент данного лекарственного препарата (перечень см. в разделе 6).
- если у вас или у вашего ребенка уже была тяжелая аллергическая реакция на какой-либо другой антибиотик. К таким реакциям относятся кожная сыпь или отек лица или горла.

Не применяйте препарат Оспамокс, если один из пунктов выше относится к вам.

Если у вас есть другие вопросы, перед применением препарата Оспамокс обсудите их с врачом или работником аптеки.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Оспамокс проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, если:

- у вас или у вашего ребенка инфекционный мононуклеоз (протекает с лихорадкой, болью в горле, увеличением шейных лимфоузлов)
- у вас или у вашего ребенка имеется заболевание почек.
- у вас или у вашего ребенка нерегулярное или сниженное мочеиспускание

Если вы не уверены, касается ли вас что-либо из вышеперечисленного, то перед применением препарата Оспамокс проконсультируйтесь с врачом.

Анализ крови и мочи

Если вам нужно сделать:

- анализ мочи (на глюкозу) или анализы крови для оценки печеночных показателей,
- анализ на эстриол (проводится во время беременности для проверки нормального развития ребенка)

вам необходимо проинформировать врача или медицинскую сестру о том, что вы принимаете препарат Оспамокс. Это необходимо, так как препарат Оспамокс может влиять на результаты данных анализов.

Другие препараты и препарат Оспамокс

Проинформируйте своего врача или работника аптеки, если вы или ваш ребенок принимаете, недавно принимали или планируете принимать другие лекарственные препараты.

- Прием **аллопуринола** (для лечения подагры) вместе с препаратом Оспамокс, повышает вероятность возникновения аллергической кожной реакции.
- При приеме **пробенецида** (для лечения подагры), врач может решить скорректировать дозу препарата Оспамокс.
- При приеме лекарственных препаратов для предотвращения образования сгустков крови (например, **варфарин**) вместе с препаратом Оспамокс, могут потребоваться дополнительные анализы крови.
- Препарат Оспамокс может влиять на эффективность **метотрексата** (лекарственного препарата для лечения рака или ревматических заболеваний).

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или осуществляете грудное вскармливание, полагаете, что вы беременны, или планируете забеременеть, перед применением данного препарата обратитесь за советом к врачу или работнику аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Оспамокс может вызывать нежелательные реакции (например, аллергические реакции, головокружение, судороги), которые могут влиять на способность управлять транспортными средствами.

Если после приема препарата вы почувствовали ухудшение самочувствия, вам следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.

Оспамокс содержит аспартам, натрий

Оспамокс содержит 8,5 мг аспартама в 5 мл готовой суспензии (обеих дозировок). Аспартам является источником фенилаланина. Оспамокс может оказаться вредным для людей с фенилкетонурией, редким генетическим заболеванием, при котором фенилаланин накапливается из-за того, что организм не может удалить его должным образом.

Оспамокс содержит 7,1 мг на 5 мл лекарственного препарата. Необходимо учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия.

Оспамокс содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в 5 мл готовой суспензии (обеих дозировок), то есть он практически не содержит натрия.

3. Прием препарата Оспамокс

Всегда принимайте препарат Оспамокс в точном соответствии с предписанием врача. Если у вас имеются вопросы, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

- Хорошо встряхивайте флакон перед каждым приемом суспензии.
- Равномерное распределите прием доз препарата в течение дня с интервалом не менее 4 часов между приемами.

Дети с массой тела менее 40 кг

Все дозы рассчитываются исходя из массы тела ребенка в килограммах.

- Врач даст вам инструкцию о том, какое количество препарата Оспамокс вы должны давать ребенку.
- Обычная доза составляет от 40 мг до 90 мг на килограмм массы тела в сутки, и ее принимают в два-три разделенных приема.
- Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг на килограмм массы тела в сутки.

Используйте дозирующий шприц, чтобы отмерить ребенку правильную дозу.

Взрослые, пожилые и дети с массой тела 40 кг и более

Данную лекарственную форму обычно не назначают взрослым и детям с массой тела 40 кг и более. Обратитесь к врачу или работнику аптеки за советом по выбору более подходящей лекарственной формы и/или дозировки препарата Оспамокс.

Пациенты с нарушениями функции почек

Если у вас или у вашего ребенка имеются проблемы с почками, доза препарата может быть уменьшена.

Если вы приняли большее количество препарата Оспамокс, чем должны были

Если вы приняли или дали своему ребенку слишком большую дозу препарата Оспамокс, могут возникнуть проблемы с желудком (тошнота, рвота или диарея), могут появиться кристаллы в моче, которые можно заметить по помутнению мочи или могут возникнуть проблемы с мочеиспусканием. Обратитесь к врачу как можно скорее. Возьмите с собой флакон препарата или листок-вкладыш и покажите его врачу.

Если вы забыли принять препарат Оспамокс

- Если вы или ваш ребенок пропустили прием препарата, примите (дайте ребенку) пропущенную дозу, как только вы вспомните об этом.
- Следующую дозу нельзя принимать слишком рано – должно пройти приблизительно 4 часа.
- Не принимайте (не давайте ребенку) двойную дозу препарата для компенсации пропущенной дозы.

Если вы прекратили прием препарата Оспамокс

- Принимайте или давайте препарат Оспамокс своему ребенку до тех пор, пока лечение не будет завершено, даже если вы или ваш ребенок почувствовали себя лучше. Для борьбы с инфекцией необходимо полностью пройти курс лечения, назначенный врачом. Если прекратить прием препарата преждевременно, некоторые бактерии могут выжить и привести к повторному появлению инфекции.
- Если вы завершили курс лечения, и все еще чувствуете себя плохо, вы должны обратиться к врачу

Молочница (дрожжевая инфекция влажных частей тела, которая может вызвать боль, зуд и белые выделения) может развиваться, если принимать Оспамокс в течение длительного периода времени. Если это произошло, сообщите об этом врачу.

Если вы принимаете Оспамокс в течение длительного времени, ваш врач назначит дополнительные анализы, чтобы проверить состояние ваших почек, печени и крови.

Инструкцию по приготовлению суспензии см. в конце листка-вкладыша.

Если у вас есть другие вопросы касательно приема данного лекарственного препарата, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции.

Как и все лекарственные препараты, препарат Оспамокс может вызывать нежелательные реакции, хотя возникают они не у всех.

Если вы заметили у себя или у вашего ребенка какую-либо из следующих серьезных нежелательных реакций, прекратите прием препарата Оспамокс и немедленно обратитесь к врачу – вам может понадобиться срочная медицинская помощь:

Следующие нежелательные реакции возникают **очень редко** (могут возникать менее чем у 1 человека из 10 000):

- аллергические реакции, симптомами могут быть: кожный зуд или сыпь, отек лица, губ, языка, тела или затрудненное дыхание. Они могут быть серьезными, иногда со смертельным исходом.
- сыпь или точечные плоские красные круглые пятна под поверхностью кожи или небольшие кровоизлияния кожи. Это происходит при аллергических реакциях из-за воспаления стенок кровеносных сосудов. Это может быть связано с болью в суставах и проблемами с почками.
- отсроченная аллергическая реакция которая может возникнуть через 7-12 дней после приема препарата, некоторые симптомы включают сыпь, лихорадку, боль в суставах и увеличение лимфатических узлов, особенно под мышками.
- кожная реакция, известная как «многоформная эритема». Возможные проявления: кожная сыпь, для которой характерно появление пятен в виде небольших мишеней: темная часть в центре окружена более бледной зоной, по контуру бледной зоны образуется темное кольцо; могут образовываться также пятна другого вида, пузырьки и иные изменения кожи. У вас может быть лихорадка и ощущение крайней усталости.
- другие тяжелые кожные реакции могут включать: изменение цвета кожи, бугристости под кожей, волдыри, пустулы, шелушение кожи, покраснение, боль, зуд, перхоть. Это может быть связано с лихорадкой, головной болью и болями в теле.
- гриппоподобные симптомы с сыпью, лихорадкой, опухшими железами и аномальными показателями крови (включая повышенный уровень лейкоцитов [эозинофилии] и ферментов печени) (лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами [DRESS])
- лихорадка, озноб, боль в горле или другие симптомы инфекции, или если вы легко получаете синяки. Это могут быть признаки того, что у вас есть проблемы с клетками крови.
- реакция Яриша-Герксгеймера, возникающая во время лечения болезни Лайма амоксициллином, вызывает лихорадку, озноб, головную боль, мышечную боль и сыпь.

- воспаление толстой кишки (антибиотик-ассоциированный колит). Возможные проявления: диарея, иногда с кровью, боль в животе, лихорадка.
- могут возникнуть тяжелые нежелательные реакции со стороны печени. В основном они затрагивают людей, которые принимают препарат в течение длительного времени, мужчин и пожилых людей. Вам нужно срочно обратиться к врачу, если у вас:
 - тяжелая диарея с кровью
 - волдыри, покраснения или небольшие кожные кровотечения
 - более темная моча или бледный стул
 - пожелтение кожи или белков глаз (желтуха). Смотрите также про анемию ниже, которая может привести к желтухе.

Это может произойти во время приема препарата или в период до нескольких недель после приема.

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам, прекратите принимать Оспамокс и немедленно обратитесь к врачу.

Иногда могут возникать менее тяжелые кожные реакции, такие как:

- легкая, зудящая сыпь (круглые, розовато-красные пятна), опухшие участки (в форме сот) на предплечьях, ногах, ладонях и подошвах стоп. Это случается нечасто (могут возникать менее чем у 1 человека из 100).

Если вы заметили что-либо из этого, поговорите со своим врачом, так как вам нужно прекратить прием препарата Оспамокс.

Другие возможные нежелательные реакции включают в себя:

Часто (могут возникать менее чем у 1 человека из 10)

- кожная сыпь
- тошнота
- диарея

Нечасто (могут возникать менее чем у 1 человека из 100)

- рвота

Очень редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 10000)

- молочница (дрожжевая инфекция влагалища, рта или кожных складок), ваш врач назначит вам лечение от молочницы.
- проблемы с почками
- судороги (у людей, принимающих препарат Оспамокс в высоких дозах или имеющих проблемы с почками)
- головокружение
- гиперактивность
- кристаллы в моче, которые можно заметить по помутнению мочи, или трудности или дискомфорт при мочеиспускании. Убедитесь, что вы пьете достаточно жидкости, чтобы уменьшить вероятность этих симптомов.
- изменение цвета зубов (отмечалось у детей), которое, как правило, устраняется чисткой зубов
- цвет языка может измениться на желтый, коричневый или черный, также он может выглядеть волосатым
- чрезмерный распад эритроцитов, вызывающий разновидность анемии. Признаки включают: усталость, головные боли, одышку, головокружение, бледность и пожелтение кожи и белков глаз.
- низкое количество лейкоцитов
- низкое количество тромбоцитов (клеток, участвующих в свертывании крови)
- кровь может сворачиваться дольше, чем обычно. Вы можете заметить это, если у вас идет носовое кровотечение или вы порезались.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту определить невозможно).

- воспаление мозговых оболочек (асептический менингит)

- боль в груди на фоне аллергических реакций, может быть симптомом инфаркта миокарда, спровоцированного аллергической реакцией (синдром Коуниса).
- сыпь с везикулами и пузырями с корками в центре, с тенденцией к группировке и образованию гирляндоподобной формы или в виде «нитки жемчуга» (IgA зависимый линейный дерматоз)
- синдром энтероколита, индуцированного лекарственным препаратом.

Сообщение о возникновении нежелательных реакций

При возникновении любых нежелательных реакций обратитесь к вашему лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Казахстан

010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13, БЦ «Нурсаулет»

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК

Телефон: +7 (7172) 235 135

E-mail: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс: +375 (17) 242 00 29

E-mail: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Кыргызская Республика

720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, д. 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Телефон: +996 312 21 92 88, +996 312 21 92 86

Факс: +996 312 21 05 08

E-mail: pharm@dlsmi.kg

5. Хранение препарата Оспамокс

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь:

Срок годности препарата Оспамокс – 3 года.

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не принимайте данный лекарственный препарат после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и флаконе. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в плотно закрытом флаконе.

Приготовленная суспензия:

Приготовленную суспензию хранить при температуре от 2 °C до 8 °C (в холодильнике) не более 14 суток.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Состав препарата Оспамокс

Действующие вещества: амоксициллин

Оспамокс, 125 мг/5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

Каждые 5 мл (1 мерный шприц) приготовленной суспензии содержат 125,00 мг амоксициллина (в виде 146,40 мг амоксициллина тригидрата).

Оспамокс, 250 мг/5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

Каждые 5 мл (1 мерный шприц) приготовленной суспензии содержат 250,00 мг амоксициллина (в виде 287,00 мг амоксициллина тригидрата).

Вспомогательные вещества:

Ароматизатор лимонный, порошок

Ароматизатор персиково-абрикосовый, порошок

Кислота лимонная безводная

Натрия бензоат

Аспартам

Тальк

Тринатрия цитрат безводный

Ароматизатор апельсиновый, порошок

Гуар

Кремния диоксид осажденный.

Описание внешнего вида

Препарат Оспамокс представляет собой порошок от белого до слегка желтоватого цвета.

После приготовления готовая суспензия имеет цвет от белого до слегка желтоватого.

Характер и содержимое упаковки

По 5,10 г (для дозировки 125 мг/5 мл) или 6,60 г (для дозировки 250 мг/5 мл) порошка во флаконе коричневого стекла с мембранным уплотнителем и закручивающейся крышкой с защитой от открывания детьми.

По 1 флакону вместе с мерным шприцем из полипропилена/полиэтилена с адаптером и инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту

Держатель регистрационного удостоверения

Австрия

Сандоз ГмбХ,

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

тел. + 386 1 5802111, + 386 1 5683517

e-mail: info.sandoz@sandoz.com.

Производитель:

Сандоз ГмбХ, Биохемиштрассе 10, А-6250 Кундль, Австрия.

Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Союза Республики Казахстан.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сандоз Казахстан».

050022 г. Алматы, ул. Курмангазы, 95.

тел.: +7 727 258-10-48.

Республика Беларусь

Представительство АО «Сандоз Фармасьютикалз д.д.» (Словения) в Республике Беларусь

220084, г. Минск, ул. Академика Купревича, д. 3, помещение 49;

Телефон: +375 (17) 370 16 20;

Факс: +375 (17) 370 16 21.

Кыргызская Республика

ОсОО Неман Фарм

720043, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1;

Телефон: +996 550 337501.

В случае возникновения вопросов обращаться на адрес электронной почты patient.safety.cis@sandoz.com (для нежелательных реакций).

Для претензий по качеству обращаться на адрес электронной почты complaint.eaeu@sandoz.com.

6.5. Данный листок-вкладыш пересмотрен

6.6. Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза.

<http://eec.eaeunion.org>.

Общие медицинские рекомендации по рациональному использованию антибиотиков

Антибиотики применяют для лечения бактериальных инфекций. Они неэффективны против вирусных инфекций.

Иногда бактериальная инфекция не реагирует на лечение антибиотиками. Одной из наиболее распространенных причин этого является тот факт, что бактерии, вызывающие инфекционное заболевание, устойчивы к используемому антибиотику. Это означает, что они способны выживать и даже размножаться, несмотря на прием антибиотика.

Бактерии могут развивать устойчивость к антибиотикам по разным причинам. Осторожное использование антибиотиков может помочь снизить риск развития устойчивости бактерий.

Если ваш врач назначает лечение антибиотиками, оно предназначено только для лечения имеющегося в настоящее время заболевания. Соблюдение следующих указаний поможет предотвратить появление резистентных бактерий, которые могут нейтрализовать действие антибиотика.

1. Очень важно, чтобы антибиотик принимался в правильной дозе, в правильное время и с правильной продолжительностью приема. Внимательно прочтите листок-вкладыш, если у вас есть вопросы, задайте их врачу или работнику аптеки.
2. Нельзя использовать антибиотик, если он не был назначен именно вашему ребенку, вы должны использовать его только для лечения инфекции согласно назначению врача.
3. Нельзя использовать антибиотики, назначенные другим людям, даже если у них была аналогичная инфекция.
4. Нельзя давать антибиотики, которые были назначены вашему ребенку, другим людям.
5. Если после завершения лечения, проведенного согласно указанию врача, у вас осталось какое-то количество антибиотиков, не выбрасывайте их в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат надлежащим образом.

Инструкция по приготовлению суспензии:

После снятия закручивающейся крышки убедитесь, что герметизирующая мембрана флакона не повреждена и плотно прилегает к горловине флакона. Не используйте препарат, если герметизирующая мембрана повреждена или неплотно прилегает к горловине флакона.

Также не следует использовать данный препарат, если до приготовления суспензии во флаконе видны комочки порошка.

Для приготовления суспензии заполните флакон питьевой водой приблизительно на 1 см не доходя до метки на флаконе, закройте флакон и тщательно взболтайте. После оседания пены добавьте воду точно до метки.

Количество порошка	Количество добавляемой воды (питьевой)	Объем приготовленной суспензии	Объем флакона
5,10 г (для дозировки 125 мг/5 мл)	56 мл	60 мл	87±3 мл
6,60 г (для дозировки 250 мг/5 мл)	55 мл	60 мл	87±3 мл

Затем закройте флакон и снова тщательно взболтайте. После этого суспензия готова к применению.

Готовая к применению суспензия должна быть белая или слегка желтоватая, с фруктовым запахом. Если цвет готовой к применению суспензии отличается от указанного, ее не следует принимать.

Перед каждым применением суспензию необходимо хорошо взболтать!

ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН
БЕКІТІЛГЕН /
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ

(на 10 листах)

ПАРАҚ / ЛИСТОВ

КҮНІ / ДАТА

03.04.25



Қосымша парақ: пациенттерге арналған ақпарат

Оспамокс, 125 мг /5 мл, ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ;
Оспамокс, 250 мг /5 мл, ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ.

Әсер етуші зат: амоксициллин

Препаратты қабылдар алдында қосымша парақты мұқият толық оқып шығыңыз, өйткені онда Сіз үшін маңызды ақпарат бар.

- Қосымша парақты сақтап қойыңыз. Сіздің оны тағы да бір рет оқып шығуыңыз қажет болуы мүмкін.
- Егер сізде қосымша сұрақтар болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.
- Осы препарат нақты сізге (немесе сіздің балаңызға) тағайындалған. Оны басқа адамдарға бермеңіз. Ол, тіпті оның ауруының симптомдары сіздікімен сәйкес келсе де, зиянын тигізуі мүмкін.
- Егер сіздің балаңызда қандай да бір жағымсыз реакциялар пайда болса, емдеуші дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз. Осындай нұсқау кез келген ықтимал жағымсыз реакцияларға, оның ішінде қосымша парақтың 4-бөлімінде атап көрсетілмеген жағымсыз реакцияларға да қатысты болады.

Қосымша парақтың мазмұны

1. Оспамокс препараты дегеніміз не және оны не үшін қолданады.
2. Оспамокс препаратын қабылдар алдында нені білу керек.
3. Оспамокс препаратын қабылдау.
4. Болуы мүмкін жағымсыз реакциялар.
5. Оспамокс препаратын сақтау.
6. Қаптаманың ішіндегісі және басқа да ақпарат

1. Оспамокс препараты дегеніміз не және оны не үшін қолданады.

Оспамокс инфекцияны туындататын бактерияларды жоятын антибиотик болып табылады. Оспамокс препаратының әсер етуші заты амоксициллин болып табылады. Амоксициллин «пенициллиндер» деп аталатын препараттар тобына жатады.

Оспамокс препараты ересектер мен балалардағы келесі инфекцияларды емдеу үшін қолданылады:

- жедел бактериялық синусит;
- жедел ортаңғы отит;
- жедел стрептококкты тонзиллит және фарингит;
- созылмалы бронхиттің асқынуы;
- ауруханадан тыс пневмония;
- жедел цистит;
- жүктілік кезіндегі симптомсыз бактериурия;
- жедел пиелонефрит;
- іш сүзегі және паратиф;
- іргелес тіндердің қабынуымен таралатын тіс маңы абсцесі;
- протезделген буындардың инфекциясы;
- *Helicobacter pylori* эрадикациясы;
- Лайм ауруы.

Сондай-ақ, Оспамокс эндокардиттің профилактикасы үшін қолданылуы мүмкін. Егер жақсару болмаса немесе 3 - 5 күннен кейін өзіңізді нашар сезінсеңіз, дәрігермен кеңесу керек.

2. Оспамокс препаратын қабылдар алдында нені білу керек.

Оспамокс препаратын қолданбаңыз,

- егер сізде немесе сіздің балаңызда амоксициллинге, басқа пенициллиндерге немесе осы дәрілік препараттың кез-келген қосымша компонентіне аллергия болса (тізімді 6-бөлімнен қараңыз).
- егер сізде немесе сіздің балаңызда қандай да бір басқа антибиотикке ауыр аллергиялық реакция болса. Мұндай реакцияларға терінің бөртпесі немесе беттің немесе тамақтың ісінуі жатады.

Егер жоғарыдағы тармақтардың бірі Сізге қатысты болса, Оспамокс препаратын қолданбаңыз.

Егер сізде басқа сұрақтар болса, Оспамокс препаратын қолданар алдында оларды дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен талқылаңыз.

Айрықша нұсқаулар және сақтық шаралары

Оспамокс препаратын қолданар алдында дәрігермен немесе дәріхана қызметкерімен кеңесіңіз, егер:

- сізде немесе сіздің балаңызда инфекциялық моноклеоз болса (қызба, тамақ ауруы, жатыр мойны лимфа түйіндерінің ұлғаюымен жүреді)
- сізде немесе сіздің балаңызда бүйрек ауруы болса.
- сізде немесе сіздің балаңызда несеп шығару тұрақсыз немесе төмендеген болса

Егер сіз жоғарыда атап көрсетілгендердің кез-келгеніне қатысты екеніңізге сенімді болмасаңыз, онда Оспамокс препаратын қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.

Қан мен несеп талдауы

Егер сізге қажет болса:

- бауыр көрсеткіштерін бағалау үшін несеп талдауы (глюкозаға) немесе қан талдауы,
- эстриолды талдау (жүктілік кезінде баланың қалыпты дамуын тексеру үшін жасалады)

сіз Оспамокс препаратын қабылдағаныңыз туралы дәрігерге немесе медбикеге хабарлауыңыз керек. Бұл қажет, өйткені Оспамокс препараты осы талдаулардың нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.

Басқа препараттар және Оспамокс препараты

Егер сіз немесе сіздің балаңыз басқа дәрілік препараттарды қабылдап жүрсеңіз, жақында қабылдасаңыз немесе қабылдауды жоспарласаңыз, дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарлаңыз.

- **Аллопуринолды** (подаграны емдеу үшін) Оспамокс препаратымен бірге қабылдау терінің аллергиялық реакциясының пайда болу ықтималдығын арттырады.
- **Пробенецидті** қабылдаған кезде (подаграны емдеу үшін) дәрігер Оспамокс препаратының дозасын түзетуге шешім қабылдауы мүмкін.
- Оспамокс препаратымен бірге қан ұйғыштарының (мысалы, **варфарин**) түзілуінің алдын алу үшін дәрілік препараттарды қабылдау кезінде қосымша қан талдауы қажет болуы мүмкін.
- Оспамокс препараты **метотрексаттың** (обыр немесе ревматизмдік ауруларды емдеуге арналған препарат) тиімділігіне әсер етуі мүмкін.

Жүктілік және бала емізу

Егер сіз жүкті болсаңыз немесе емізетін болсаңыз, жүктімін деп ойласаңыз немесе жүкті болуды жоспарласаңыз, осы препаратты қолданар алдында дәрігерден немесе дәріхана қызметкерінен кеңес сұраңыз.

Көлік құралдарын басқару және механизмдермен жұмыс жасау

Оспамокс препараты көлік құралдарын басқару қабілетіне әсер етуі мүмкін жағымсыз реакцияларды (мысалы, аллергиялық реакциялар, бас айналу, құрысулар) туындатуы мүмкін.

Егер сіз препаратты қабылдағаннан кейін өзіңізді нашар сезінсеңіз, көлік құралдарын басқарудан немесе механизмдермен жұмыс істеуден тартынуыңыз керек.

Оспамокс құрамында аспартам, натрий бар

Оспамокс құрамында 5 мл дайын суспензияда (екі дозада да) 8,5 мг аспартам бар. Аспартам фенилаланиннің көзі болып табылады. Оспамокс фенилкетонуриясы, сирек генетикалық ауруы бар адамдар үшін зиянды болуы мүмкін, онда фенилаланин организм оны тиісті түрде шығара алмайтындықтан жиналады.

Оспамокстың құрамында 5 мл дәрілік препаратқа 7,1 мг бар. Натрийдің түсуі шектеулі диетадағы пациенттерге ескеру қажет.

Оспамокстың құрамында 5 мл дайын суспензияда (екі дозада да) 1 ммольден кем натрий (23 мг) бар, яғни оның құрамында натрий жоқ дерлік.

3. Оспамокс препаратын қабылдау

Әрқашан Оспамокс препаратын дәрігердің нұсқауы бойынша дәл қабылдаңыз. Егер сізде сұрақтар болса, дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.

- Суспензияны әр қабылдағанға дейін құтыны жақсылап шайқаңыз.
- Препараттың дозаларын қабылдау арасында кемінде 4 сағат аралықпен күні бойы біркелкі таратыңыз.

Дене салмағы 40 кг-ден кем балалар

Барлық дозалар баланың дене салмағына қарай килограммен есептеледі.

- Дәрігер сізге балаңызға Оспамокс препаратының қанша мөлшерін беру керектігі туралы нұсқаулық береді.
- Әдеттегі доза тәулігіне дене салмағының әр килограммына 40 мг-ден 90 мг-ге дейін және оны екі-үш бөлінген қабылдауда қабылданады.
- Ұсынылатын ең жоғары доза тәулігіне дене салмағының әр килограммына 100 мг құрайды.

Балаңызға дұрыс дозаны өлшеу үшін дозалаушы шприцті пайдаланыңыз.

Дене салмағы 40 кг және одан жоғары ересектер, егде жастағы адамдар және балалар

Бұл дәрілік түрді әдетте ересектер мен дене салмағы 40 кг немесе одан көп балаларға тағайындамайды. Оспамокс препаратының неғұрлым қолайлы дәрілік түрін және/немесе дозасын таңдау бойынша кеңес алу үшін дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер

Егер сізде немесе сіздің балаңызда бүйрекпен проблемалар болса, препараттың дозасын азайтуға болады.

Егер сіз Оспамокс препаратын керекті мөлшерден көбірек мөлшерде қабылдасаңыз

Егер сіз Оспамокс препаратының тым көп дозасын қабылдасаңыз немесе балаңызға берсеңіз, асқазанмен проблемалар (жүрек айнуы, құсу немесе диарея) пайда болуы мүмкін, несепте кристалдар пайда болуы мүмкін, оларды несептің бұлыңғырлығынан байқауға болады немесе несеп шығарумен проблемалар пайда болуы мүмкін. Мүмкіндігінше тезірек дәрігерге барыңыз. Өзіңізбен бірге препарат құтысын немесе қосымша парақты алыңыз және оны дәрігерге көрсетіңіз.

Егер сіз Оспамокс препаратын қабылдауды ұмытып кетсеңіз

- Егер сіз немесе сіздің балаңыз препаратты өткізіп алған болса, есіңізге түскен бойда өткізіп алған дозаны қабылдаңыз (балаңызға беріңіз).
- Келесі дозаны тым ерте қабылдауға болмайды-шамамен 4 сағат өтуі тиіс.

- Өткізіп алған дозаны өтеу үшін препараттың қосарлы дозасын қабылдамаңыз (балаңызға бермеңіз).

Егер сіз Оспамокс препаратын қабылдауды тоқтатсаңыз

- Егер сіз немесе сіздің балаңыз тіпті өзін жақсы сезінсе де, емдеу аяқталғанға дейін Оспамокс препаратын қабылдаңыз немесе балаңызға беріңіз. Инфекциямен күресу үшін дәрігер тағайындаған емдеу курсынан толық өту керек. Егер препаратты қабылдауды мерзімінен ерте тоқтатсаңыз, кейбір бактериялар өмір сүріп, инфекцияның қайта пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Егер сіз емдеу курсы аяқтаған болсаңыз және өзіңізді нашар сезінсеңіз, дәрігерге қаралуыңыз керек

Микоз (дененің ылғалды бөліктерінің ашытқы инфекциясы, ол ауыруды, қышынуды және ақ бөліністерді туындатуы мүмкін) ұзақ уақыт бойы Оспамокс қабылдаған кезде дамуы мүмкін. Егер бұл орын алса, дәрігерге бұл туралы хабарлаңыз.

Егер сіз Оспамоксты ұзақ уақыт қабылдасаңыз, дәрігер бүйректің, бауырдың және қанның жай-күйін тексеру үшін қосымша талдауларды тағайындайды.

Суспензияны дайындау жөніндегі нұсқаулықты қосымша парақтың соңынан қараңыз.

Егер сізде осы дәрілік препаратты қабылдауға қатысты басқа сұрақтарыңыз болса, дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне хабарласыңыз.

4. Болуы мүмкін жағымсыз реакциялар.

Барлық дәрілік препараттар сияқты, Оспамокс препараты барлығында бірдей пайда бола қоймайтын жағымсыз реакцияларды туындатуы мүмкін.

Егер сізде немесе сіздің балаңызда келесі күрделі жағымсыз реакциялардың қандай да бірін байқасаңыз, Оспамокс препаратын қабылдауды тоқтатыңыз және дереу дәрігерге хабарласыңыз-сізге шұғыл медициналық көмек қажет болуы мүмкін:

Келесі жағымсыз реакциялар өте сирек кездеседі (10000 адамның көп дегенде 1-де пайда болуы мүмкін):

- аллергиялық реакциялар, симптомдары төмендегі болуы мүмкін: терінің қышынуы немесе бөртпе, беттің, еріннің, тілдің, дененің ісінуі немесе тыныс алудың қиындауы. Олар күрделі болуы мүмкін, кейде өліммен аяқталатын.
- тері беткейінің астындағы бөртпе немесе нүктелі тегіс қызыл дөңгелек дақтар немесе терінің аздаған қан құйылулары. Бұл қан тамырлары қабырғаларының қабынуына байланысты аллергиялық реакциялар кезінде пайда болады. Бұл буын ауруы мен бүйрекпен проблемалармен байланысты болуы мүмкін.
- кешеуілдеген аллергиялық реакция препаратты қабылдағаннан кейін 7-12 күннен кейін пайда болуы мүмкін кейбір симптомдарға бөртпе, қызба, буын ауруы және лимфа түйіндерінің, әсіресе қолтық астындағы үлкеюі жатады.
- «көп формалы эритема» ретінде белгілі тері реакциясы. Ықтимал көріністер: кішкентай нысандар түрінде дақтардың пайда болуымен сипатталатын тері бөртпесі: ортасындағы күңгірт бөлік бозғылт аймақпен қоршалған, бозғылт аймақтың контурында қара сақина пайда болады; басқа түрдегі дақтар, көпіршіктер және терінің басқа өзгерістері де пайда болуы мүмкін. Сізде қызба және қажу сезімі болуы мүмкін.
- терінің басқа ауыр реакцияларына мыналар кіруі мүмкін: терінің түсінің өзгеруі, тері астындағы түйнектер, күлдіреуіктер, пустулдар, терінің қабыршақтануы, қызару, ауыру, қышыну, қайызғақ. Бұл қызбамен, бас ауруымен және дене ауруымен байланысты болуы мүмкін.
- бөртпе, қызба, бездердің ісінуі және қанның қалыптан тыс көрсеткіштерімен тұмауға ұқсас симптомдар (лейкоциттердің [эозинофилия] және бауыр ферменттері деңгейінің жоғарылауын қоса) (эозинофилиямен және жүйелік симптомдармен дәрілік реакция [DRESS])
- қызба, қалтырау, тамақ ауруы немесе инфекцияның басқа симптомдары немесе егер

сізде көгеру оңай пайда болса. Бұл сізде қан жасушаларымен проблемалар бар екендігінің белгілері болуы мүмкін.

- Лайм ауруын амокциллинмен емдеу кезінде пайда болатын Яриш-Герксгеймер реакциясы қызба, қалтырау, бас ауруы, бұлшықет ауруы және бөртпе туындатады.
- тоқ ішектің қабынуы (антибиотик астасқан колит). Ықтимал көріністер: диарея, кейде қан аралас, іштің ауыруы, қызба.
- бауыр тарапынан ауыр жағымсыз реакциялар пайда болуы мүмкін. Олар негізінен препаратты ұзақ уақыт қабылдаған адамдарға, ерлер мен егде жастағы адамдарға қатысты болады. Егер сізде төмендегі болса, шұғыл түрде дәрігерге бару керек:
 - қан аралас ауыр диарея
 - күлдіреуіктер, қызару немесе теріден аздап қан кетуі
 - едәуір қараңғы несеп немесе бозғылт нәжіс
 - терінің немесе көздің ағының сарғаюы (сарғаю). Төменде сарғаюға әкелуі мүмкін анемия туралы да қараңыз.

Бұл препаратты қабылдау кезінде немесе қабылдағаннан кейін бірнеше аптаға дейін кезеңде болуы мүмкін.

Егер жоғарыда атап көрсетілгендердің қандай да бірі сізге қатысты болса, Оспамокссты қабылдауды тоқтатып, дереу дәрігерге қаралыңыз.

Кейде онша ауыр емес тері реакциялары пайда болуы мүмкін, төмендегі сияқты:

- білектерде, аяқтарда, алақандарда және табандарда жеңіл, қышитын бөртпе (дөңгелек, қызғылт-қызыл дақтар), ісінген жерлер (бал түрінде). Бұл жиі емес кездеседі (100 адамның көп дегенде 1-де пайда болуы мүмкін).

Егер сіз мұның қандай да бірін байқасаңыз, дәрігеріңізбен сөйлесіңіз, өйткені сіз Оспамокс препаратын қабылдауды тоқтатуыңыз керек.

Басқа ықтимал жағымсыз реакцияларға мыналар жатады:

Жиі (10 адамның көп дегенде 1-де пайда болуы мүмкін)

- тері бөртпесі
- жүрек айнуы
- диарея

Жиі емес (100 адамның көп дегенде 1-де пайда болуы мүмкін)

- құсу

Өте сирек (10000 адамның көп дегенде 1-де пайда болуы мүмкін)

- микоз (қынаптың, ауыздың немесе тері қатпарларының ашытқы инфекциясы), дәрігер сізге микозды емдеуді тағайындайды.
- бүйрекпен проблемалар
- Құрысулар (Оспамокс препаратын жоғары дозада қабылдайтын немесе бүйрекпен проблемалары бар адамдарда)
- бас айналу
- гипербелсенділік
- несептегі кристалдар, несептің бұлыңғырлануы, немесе несеп шығарудың қиындауы немесе жайсыздығы арқылы байқалуы мүмкін. Бұл симптомдардың ықтималдығын азайту үшін жеткілікті сұйықтық ішкеніңізге көз жеткізіңіз.
- тістердің түсінің өзгеруі (балаларда байқалды), ол әдетте тістерді тазалау арқылы кетеді
- тілдің түсі сары, қоңыр немесе қара болып өзгеруі мүмкін, сонымен қатар түкті болып көрінуі мүмкін
- анемияның әр түрін тудыратын эритроциттердің шамадан тыс ыдырауы. Белгілерге мыналар жатады: шаршау, бас ауруы, енгігу, бас айналу, терінің және көздің ақтығының бозаруы және сарғаюы.
- лейкоциттердің төмен мөлшері
- тромбоциттердің төмен мөлшері (қанның ұюына қатысатын жасушалар)

- қан әдеттегіден ұзағырақ ұюы мүмкін. Егер сізде мұрыннан қан кетсе немесе кесіп алсаңыз, мұны байқай аласыз.

Жиілік белгісіз (қолда бар деректер негізінде жиілікті анықтау мүмкін емес).

- ми қабығының қабынуы (асептикалық менингит)
- аллергиялық реакциялар аясында кеуденің ауыруы аллергиялық реакциядан (Коунис синдромы) туындаған миокард инфарктісінің симптомы болуы мүмкін.
- ортасында қыртысы бар везикулалармен және күлдіреуіктермен бөртпе, гирлянда тәрізді пішінді топтастыру және қалыптастыру үрдісі немесе "інжу тізбегі" (IgA тәуелді сызықтық дерматоз)
- дәрілік препарат индукциялаған энтероколит синдромы.

Жағымсыз реакциялар жөнінде мәлімдеме

Кез келген жағымсыз реакциялар пайда болған кезде, емдеуші дәрігерге немесе мейірбикеге хабарласыңыз. Бұл ұсыным кез келген жағымсыз реакцияларға, оның ішінде осы парақ-қосымша парақта санамаланмағандарға да қолданылады. Сондай-ақ кез келген күдікті жағымсыз реакциялар туралы тікелей хабарлауға болады (төменде қараңыз). Жағымсыз реакциялар туралы хабарлай отырып, сіз дәрілік препараттың қауіпсіздігі туралы көбірек мәліметтер алуға көмектесесіз.

Қазақстан Республикасы

010000, Астана қ., А. Иманов көш., 13, «Нұрсәулет» БО

ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК

Телефон: +7 (7172) 235 135

E-mail: farm@dari.kz

www.ndda.kz

Беларусь Республикасы

220037, Минск қ., Товарищеский тұйық көш., 2а

«Денсаулық сақтау саласындағы сараптамалар және сынақтар орталығы» РУК

Телефон/факс: +375 (17) 242 00 29

E-mail: rcpl@rceth.by

www.rceth.by

Қырғыз Республикасы

720044, Бішкек қ., 3-ші линия көш., 25-үй

Қырғыз Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрілік заттар және медициналық бұйымдар департаменті

Телефон: +996 312 21 92 88, +996 312 21 92 86

Факс: +996 312 21 05 08

E-mail: pharm@dlsmi.kg

5. Оспамокс препаратын сақтау

Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ:

Оспамокс препаратының жарамдылық мерзімі-3 жыл.

Дәрілік препаратты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл дәрілік препаратты картон қорапта және құтыда көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін қабылдамаңыз. Жарамдылық мерзімі көрсетілген айдың соңғы күні болып табылады.

25°C-ден аспайтын температурада сақтау керек. Тығыз жабылған құтыда сақтау керек.

Дайындалған суспензия:

Дайындалған суспензияны 2 °C-ден 8 °C-ге дейінгі температурада (тоңазытқышта) 14 тәуліктен асырмай сақтау керек.

Препаратты кәрізге немесе тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Дәріхана қызметкерінен қажет емес препаратты қалай утилизациялау керектігін нақтылаңыз. Бұл шаралар қоршаған ортаны қорғауға мүмкіндік береді.

6. Қаптаманың ішіндегісі және басқа ақпарат

Оспамокс препаратының құрамы

Әсер етуші заттар: амоксициллин

Оспамокс, 125 мг/5 мл, ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ.

Дайындалған суспензияның әрбір 5 мл (1 өлшеуіш шприц) ішінде 125,00 мг амоксициллин (146,40 мг амоксициллин тригидраты түрінде) бар.

Оспамокс, 250 мг/5 мл, ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ.

Дайындалған суспензияның әрбір 5 мл (1 өлшеуіш шприц) ішінде 250,00 мг амоксициллин (287,00 мг амоксициллин тригидраты түрінде) бар.

Қосымша заттар:

Лимон хош иістендіргіші, ұнтақ

Шабдалы-өрік хош иістендіргіші, ұнтақ

Сусыз лимон қышқылы

Натрий бензоаты

Аспартам

Тальк

Сусыз тринатрий цитраты

Апельсин хош иістендіргіші, ұнтақ

Гуар

Кремнийдің қостотығы тұндырылған.

Сыртқы түрінің сипаттамасы

Оспамокс препараты ақтан сәл сарғыш түске дейінгі ұнтақ болып табылады.

Дайындағаннан кейін дайын суспензия ақтан сәл сарғыш түске дейін болады.

Қаптаманың сипаты мен ішіндегісі

5,10 г (125 мг/5 мл доза үшін) немесе 6,60 г (250 мг/5 мл доза үшін) ұнтақтан жарғақшалық тығыздағышы және балалардың ашуынан қорғауы бар бұрандалы қақпағы бар қоңыр шыны құтыда.

1 құтыдан адаптері бар полипропилен/полиэтилен өлшеуіш шприцпен және қазақ және орыс тілдеріндегі медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Дәрілік препаратты босату санаты

Дәрілік препарат рецепт арқылы босатылатын санатқа жатады

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы

Австрия

Сандоз ГмбХ,

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

тел. + 386 1 5802111, + 386 1 5683517

e-mail: info.sandoz@sandoz.com.

Өндіруші:

Сандоз ГмбХ, Биохемиштрассе 10, А-6250 Кундль, Австрия.

**Тіркеу куәлігі ұстаушысының Одақ аумағындағы өкілі
Қазақстан Республикасы.**

«Сандоз Казахстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

050022 Алматы қ., Құрманғазы көш., 95.

Тел.: +7 727 258-10-48.

Беларусь Республикасы

«Сандоз Фармасьютикалз д.д.» АҚ (Словения) Беларусь Республикасындағы өкілдігі

220084, Минск қ., Академик Купревич көш., 3-үй, 49-орын-жай;

Телефон: +375 (17) 370 16 20;

Факс: +375 (17) 370 16 21.

Қырғыз Республикасы

ОсОО Неман Фарм

720043, Қырғыз Республикасы, Бішкек қ., Садығалиева көш., 1;

Телефон: +996 550 337501.

Сұрақтар пайда болған жағдайда patient.safety.cis@sandoz.com электрондық поштасына хабарласыңыз (жағымсыз реакциялар үшін).

Сапа бойынша шағымдар үшін complaint.eaeu@sandoz.com электрондық поштасына хабарласыңыз.

6.5 Қосымша парақ қайта қаралды**6.6 Басқа да ақпарат көздері**

Препарат туралы толық мәліметтер Одақтың веб-сайтында бар.

<http://eec.eaeunion.org>.

Антибиотиктерді ұтымды пайдалану бойынша жалпы медициналық ұсынымдар

Антибиотиктерді бактериялық инфекцияларды емдеу үшін қолданады. Олар вирустық инфекцияларға қарсы тиімді емес.

Кейде бактериялық инфекция антибиотиктермен емдеуге жауап бермейді. Мұның едәуір көп тараған себептерінің бірі инфекциялық ауруды туындататын бактериялардың пайдаланылатын антибиотикке төзімді болу фактісі болып табылады. Бұл олардың антибиотик қабылдағанына қарамастан өмір сүруге және тіпті көбеюге қабілетті екенін білдіреді.

Бактериялар әртүрлі себептермен антибиотиктерге төзімділікті дамыта алады. Антибиотиктерді сақтықпен пайдалану бактерияларға төзімділіктің даму қаупін азайтуға көмектеседі.

Егер сіздің дәрігеріңіз антибиотиктермен емдеуді тағайындаса, ол тек қазіргі жағдайды емдеуге арналған. Келесі нұсқауларды орындау антибиотиктің әсерін бейтараптандыруы мүмкін резистентті бактериялардың пайда болуының алдын алуға көмектеседі.

1. Антибиотикті дұрыс дозада, дұрыс уақытта және дұрыс қабылдау ұзақтығымен қабылдау өте маңызды. Қосымша парақты мұқият оқып шығыңыз, егер сізде сұрақтар болса, оларды дәрігерге немесе дәріхана қызметкеріне қойыңыз.
2. Антибиотикті пайдалануға болмайды, егер ол нақты сіздің балаңызға тағайындалмаған болса, оны тек дәрігердің тағайындауы бойынша инфекцияны емдеу үшін пайдалануға тиіссіз.
3. Басқа адамдарға тағайындалған антибиотиктерді, егер тіпті оларда ұқсас инфекция болса да, пайдалануға болмайды.
4. Балаңызға тағайындалған антибиотиктерді басқа адамдарға беруге болмайды.
5. Егер дәрігердің нұсқауы бойынша емдеу аяқталғаннан кейін сізде антибиотиктердің қандай да бір мөлшері қалса, оларды кәрізге немесе тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Дәріхана қызметкерінен препаратты тиісті түрде қалай утилизациялау керектігін нақтылаңыз.

Суспензияны дайындау жөніндегі нұсқаулық:

Бұрандалы қаппақты алып тастағаннан кейін, құтының герметизациялайтын жарғақшасының зақымдалмағанына және құтының мойнына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер герметизациялайтын жарғақша зақымданған болса немесе құтының мойнына тығыз емес жабысып қалса, препаратты пайдаланбаңыз.

Сондай-ақ, егер суспензияны дайындамас бұрын құтыда ұнтақ кесектері көрінсе, бұл препаратты пайдаланбаған жөн.

Суспензияны дайындау үшін құтыны құтыдағы белгіге шамамен 1 см жеткізбей ауыз сумен толтырыңыз, құтыны жабыңыз және жақсылап шайқаңыз. Көбік тұнғаннан кейін, нақты белгіге дейін су қосыңыз.

Ұнтақ мөлшері	Қосылатын су мөлшері (ауыз су)	Дайындалған суспензияның көлемі	Құты көлемі
5,10 г (125 мг/5 мл доза үшін)	56 мл	60 мл	87±3 мл
6,60 г (250 мг/5 мл доза үшін)	55 мл	60 мл	87±3 мл

Содан кейін құтыны жауып, қайтадан жақсылап шайқаңыз. Осыдан кейін суспензия қолдануға дайын.

Қолдануға дайын суспензия ақ немесе сәл сарғыш, жеміс иісі бар болуы тиіс. Егер қолдануға дайын суспензияның түсі көрсетілгеннен өзгеше болса, оны қабылдамаған жөн.

Әр қолданар алдында суспензияны жақсылап шайқау керек!

ТІГІЛГЕН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МӨРМЕН
БЕКІТІЛГЕН /
ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ

(на 10 листах)

ПАРАҚ / ЛИСТОВ

КҮНІ / ДАТА

03.04.25

